



# Dé la bienvenida a una vida libre de hemorroides

¡Felicitaciones en su  
procedimiento SpaceBander®!



## Recomendaciones luego de su procedimiento de SpaceBander®

### INMEDIATAMENTE POSTERIOR A SU PROCEDIMIENTO:

- ▶ Su médico podría sugerir esperar en el consultorio durante 5 ó 10 minutos para acostumbrarse a la sensación temporal de 'presión' en el área rectal.
- ▶ Puede que sienta que tiene que usar el baño, esto es normal.
- ▶ Se recomienda utilizar suplementos de fibra y ablandadores de heces tanto como sea posible.
- ▶ Puede que vea leves manchas de sangre durante aproximadamente 48 horas después de su procedimiento de ligadura de banda elástica.
- ▶ Si ocurre sangrado abundante, fiebre, dificultad al orinar o se desarrolla cualquier otro asunto médico inusual, póngase en contacto con su doctor inmediatamente o diríjase a la sala de emergencias más cercana.
- ▶ Los analgésicos tales como la acetaminofén son generalmente seguros de usar para la incomodidad rectal.

### DURANTE LA PRIMERA SEMANA LUEGO DEL PROCEDIMIENTO:

- ▶ Los baños tibios de asiento están permitidos.
- ▶ Limite el levantamiento de pesas, relaciones sexuales, montar en bicicleta, correr u otras actividades extenuantes.
- ▶ Continúe usando suplementos de fibra y consumiendo alimentos con fibra dietética.

### DESPUÉS DE UNA SEMANA:

- ▶ Siga las recomendaciones específicas de su proveedor de atención médica.

SpaceBander® está diseñado para la comodidad óptima del paciente, durante y después del procedimiento.

La experiencia real del paciente puede variar según la técnica del médico, el número de bandas elásticas aplicadas y la localización de la hemorroide interna que está siendo tratada.



For more information visit: [www.spacebanderlatinamerica.com](http://www.spacebanderlatinamerica.com)

SPACEBANDER CORPORATION • ALL RIGHTS RESERVED • REV 22.1

